

hatte, schreibt dagegen: „face and undersurface of the antennae yellowish white“. Cameron hat damals wirklich etwas zu schwarz gesehen, denn er nennt auch die „mandibles black“, während sie in Wirklichkeit größtenteils weiß sind, wie dies bei einer *Rhogogaster* mit weißem Untergesicht auch gar nicht anders zu erwarten ist.

Cameron nannte die Art *amoorensis*. Die von Kirby und nach ihm von Konow angenommene Schreibweise *amurensis* dürfte nicht zulässig sein, wenn sie auch philologisch die richtige wäre.

In Wytzman-Konow Genera Insectorum Fam. *Tenthredinidae* sind im Genus *Rhogogaster* folgende Änderungen vorzunehmen:

Der Name *Rhogogastera* muß ungeändert werden in *Rhogogaster* Konow, Deutsch. Ent. Zeitschr. 1884, und *Rhogogastera* ist dazu als synonym zu setzen.

2. *Rh. amurensis* Cam. muß heißen: *Rh. amoorensis* Cam.

13. *Rh. pusilla* Jokovl. und

14. *Rh. virescens* Jokovl. sind zu streichen und in das Genus *Sciopteryx* zu versetzen.

Herrn Kustos Sig. Schenkling habe ich vielmals zu danken, daß er mir Insektenmaterial und Literatur des Deutschen Entomol. National-Museums in bereitwilligster Weise zur Verfügung stellte.

Berichtigung. (Hym.)

Von Prof. H. Habermehl, Worms a. Rh.

Eine nochmalige Prüfung der von mir in D. E. Z. 1909, Heft V, p. 636—638 unter Nr. 21 und 22 als neu beschriebenen Ichneumoniden *Exolytus areolaris* ♀ und *E. longicornis* ♂ hat folgendes ergeben:

21. *Exolytus areolaris* ♀ = *Atractodes gravidus* Grav. ♀.

22. *Exolytus longicornis* ♂ = *Callidiotes luridator* Grav. ♂.

Beide Neubeschreibungen sind also zu streichen.